

실어증은 개인의 지적능력에 영향을 주는가?

아니다. 실어증환자는 단어들이나 이름들을 생각해내는데 어려움을 가질지 모르나 개인적인 지적능력은 기본적으로 유지되어있는 상태다. 실어증은 알츠하이머(치매)가 아니다; 실어증 환자는 생각이나 사고를 언어로 표현해 낼 수 있는 능력에 문제가 있는 사람들이다. 그러나 실어증환자들은 대화에 문제가 있기때문에 타인들은 흔히 실어증환자들이 정신이상이나 정신박약이 있는 것으로 잘못 여겨질 수 있다.

모든 실어증의 경우들은 비슷한가?

아니다. 여러가지 종류의 실어증들이 있다. 어떤 환자는 말하는데 어려움이있고, 어떤 환자는 대화를 유지하기가 힘들다. 어떤 환자들에게는 실어증이 대단히 경미하고, 그 사실을 금방 알 수 없을 수도 있다. 어떤 경우에는 실어증이 굉장히 심하며, 말하고, 쓰고, 읽고, 듣는데 영향을 줄 수 있다. 개인적인 증상들이 각기 크게 다를 수 있지만 실어증환자의 공통적인 증상은 대화하는데 어려움이 있다는 것이다.

어디서 좀 더 자세한 정보를 얻을 수 있는가?

국내 실어증협회(NAA)의 무료전화번호 800-922-4622 또는 웹사이트 www.aphasia.org 의 응답센터를 접촉하면 된다. NAA는 실어증에 대한 정보를 제공함은 물론, 실어증을 지니고 사는 방식, 이를 지원하는 국가적인 지원단체의 리스트, 후보, 국가적인 회의 및 기타 행사들에 대한 정보를 제공한다.

NAA는 환자와 가족들을 지원과 안내로 돕고, 실어증에 대한 인식을 높이며, 실어증 종류에 차별없이 사회와 환자를 다시 연결시키는 목적을 갖고있다.

aphasia

NATIONAL
APHASIA
ASSOCIATION

국내 실어증협회

주소: 350 Seventh Avenue, Suite 902

New York, NY 10001

전화: 1-800-922-4622

Funding for this brochure was generously provided by the Milton and Miriam Handler Foundation.

aphasia

NATIONAL
APHASIA
ASSOCIATION

실어증에 대한 문답

실어증

일반적으로 뇌졸중이나 다른 뇌손상으로 얻어지는 단어들을 이해하거나 사용하는 능력의 장애

WHAT IS IT?

실어증이란 ?

실어증은 언어를 진행하는 능력의 손상으로 생긴 언어 장애이지만 지적능력에는 영향을 주지 않는다. 실어증 환자들은 말과 이해에 어려움이 있고 그들의 대부분이 읽거나 쓰는데 어려움을 겪는다.

무엇이 실어증을 생기게 하나 ?

가장 일반적인 실어증의 원인은 뇌졸중(뇌졸중 생존자의 25%~40%가 실어증을 얻게 된다). 또한 뇌손상이나 뇌종양 또는 기타 신경적인 원인으로 부터 생겨난다.

실어증은 얼마나 흔한가 ?

실어증은 대략 백만명의 미국인들이 - 250명당 1명 정도- 겪고 있고, 파킨슨병, 뇌성마비, 근위축증 보다 일상적이다. 매년 십만명 이상의 미국인들이 이 증상을 보이고 있으나, 대부분의 사람들은 실어증에 대해 전혀 모르고있다.

어떤 사람들이 실어증을 앓는가 ?

대부분 나이 든 사람들이 실어증을 앓지만 거의 모든 연령, 인종, 민족, 남녀에게 생길 수 있다.

개인은 육체적인 불구에 관계없이 실어증을 앓을 수 있는가 ?

그렇다. 많은 실어증환자들이 또한 오른쪽다리와 오른쪽팔의 마비 또는 쇠약함을 느낄 수 있다. 실어증 환자는 일반적으로 신체오른쪽의 움직임을 통제하는 왼쪽뇌에 손상을 입었을 경우이다.

실어증환자들은 그들의 직업에 돌아 갈수 있나 ?

어떤 때는 가능하다. 거의 모든 직업이 언어나 대화의 기능을 필요로 하기때문에 일에따라 경우가 다를 수 있다. 아주 경미한 실어증환자들은 일하기 위해 돌아 갈 수도 있지만, 직업을 바꾸어야 할 경우도있다.

실어증은 회복되는데는 얼마나 걸리나 ?

만약 실어증 증세가 뇌졸중 이후 2~3개월 이상 지속되면 완전한 회복은 힘들다. 그러나, 어떤 사람들의 증세는 몇년이나 수십년이 지나면서 호전된다는 사실을 주목할 필요가 있다. 개선은 일반적으로 실어증 증세를 이해하는 개인과 가족들의 도움에 힘입고 대화를 위한 보충적인 전략을 배움으로 인해 천천히 진행된다.

실어증환자와 어떻게 대화하는가 ?

- 실어증 환자에게 말할 시간을 주고, 환자가 원하지 않을 경우에는 문장을 끝내게 하지 말라.
- 배경소음에 예민하고 라디오나 텔레비전같은 중복된 소리들을 가능하면 없애라.
- 말외의 예를 들면 그림에 의하거나 몸짓에 의한 대화의 방법을 고려해라.
- 성공적으로 대화하고 있음을 확인하라